COLIPEX®

TRATAMIENTO EMOLIENTE Y CALMANTE EN CASOS DE DIABETES MELLITUS

FÓRMULA INNOVADORA QUE OFRECE UNA SOLUCIÓN PREVENTIVA AL PACIENTE DIABÉTICO MINIMIZANDO EL RIESGO DE DESARROLLO DE LIPODISTROFIAS

INOVACIÓN COSMETICA

COMPLEJO PATENTADO
3Ca-elastárgeno

FORMULACIÓN ÚNICA DE ELEMENTOS ACTIVOS

3Ca-elastárgeno

Combinación única de elementos activos:

"Elastárgeno" por la elastina, árnica y el colágeno

3Ca: por cafeína, colágeno y L-carnitina.

El 3Ca-elastárgeno presente en Colipex ® proporciona múltiples beneficios:

- ESTIMULA LA CAPACIDAD DE HIDRATACION Y REGENERACION DE LA PIEL
- PRESENTA UN EFECTO REPARADOR DE LA PIEL
- HIDRATA APORTANDO FRESCURA Y ELASTICIDAD
- AYUDA A MEJORAR LA PIEL DAÑADA

LA LIPODISTROFIA EN 8 PREGUNTAS

LA DIABETES EN ESPAÑA

Estudios realizados en la población española* revelan cifras de prevalencia de esta enfermedad superiores a los 5 millones, de los cuales sólo 3 millones están diagnosticados.
Diabetes tipo1 su incidencia ha experimentado un aumento progresivo en los últimos años en todas las regiones alcanzando en algunos casos valores del orden de 20 individuos por cada 100.000 habitantes, a pesar de que teóricamente la diabetes tipo 1 no guarda relación con el estilo de vida.
Diabetes tipo 2 más frecuente en edades avanzadas, cuando existen antecedentes familiares con diabetes y en personas con obesidad. Por encima de los 75 años la prevalencia es del 41,3% en mujeres y de 37,4% en varones, mientras que la prevalencia media total en España en personas mayores de 18 años es del 13,8%.

1. ¿QUÉ SON LAS LIPODISTROFIAS?

La lipodistrofia son defectos del tejido graso causados por la acción lipogénica de la insulina
Lipodistrofia hipertrófica o hipertrofia insulínica:
Se manifiesta por zonas de hinchazón y endurecimiento en donde se inyecta la insulina, debido a la hipertrofia de las células grasas.
Al contrario la lipodistrofia lipoatrófica o lipoatrofia insulínica:
Se manifiesta con zonas deprimidas producida por la pérdida de tejido celular subcutáneo alrededor del lugar de inyección. Más frecuente en mujeres jóvenes y en niños, se relaciona con problemas inmunológicos, ha disminuido su incidencia con la introducción de insulinas altamente purificadas.

2. ¿CÓMO SE DESARROLLAN LAS LIPODISTROFIAS?

Existen evidencias que relacionan el desarrollo de estas lipodistrofias con malos hábitos en la inyección de la insulina. **
Al ser una zona menos dolorosa, el paciente repite allí la inyección empeorando la situación. Se produce por la acción anabólica-proliferativa de la insulina sobre el tejido que la recibe. Al tratarse de un tejido mal irrigado, la insulina se absorbe peor aumentando innecesariamente las dosis con el riesgo de provocar hipoglucemia si se administra esta dosis en otro punto de absorción normal.
Para prevenir esta complicación, **es aconsejable cambiar a menudo la zona de inyección con una rotación sistemática y sin utilizar alcohol como desinfectante.**

3. ¿DÓNDE PUEDEN DESARROLLARSE LAS LIPODISTROFIAS?

las lipodistrofias pueden desarrollarse en cualquier lugar donde se inyecte la insulina:

- Muslos
- Abdomen inferior y abdomen superior
- Parte alta del brazo
- Caderas
- Nalgas



4. ¿CON QUE FRECUENCIA SE DESARROLLAN LAS LIPODISTROFIAS?

Diferentes estudios revelan una alta prevalencia de lipohipertrofia entre los pacientes que se inyectan insulina, cifras que **oscilan entre el 30% y el 51%.*****

El control de la lipodistrofia no se incluye en los controles rutinarios a los que se somete el paciente diabético, hecho por el cual esta complicación está subestimada.

*Estudio diabetes. Centro de Investigación Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas (CIBERDEM)
**B.Vardar, S. Kiziki. Incidence of lipohypertrophy in diabetic patients and a study of influencing factors. Dia. Res. Clin. Pract.77 (2007) 231-236.
***M.Jansà, C. Collungo, M. Vidal. Actualización sobre técnicas y sistemas de administración de la insulina (y II). Av Diabetol. 2008; 24(4):347-354.

5. ¿CUALES SON LAS CARACTERISITICAS DE LA LIPODISTROFIA?

Se presentan en diferentes formas y tamaños, siendo más fáciles de palpar que visualizar. Una correcta detección requiere su reconocimiento visual y táctil:

Observar los puntos de inyección, pequeñas zonas de equimosis, hipertrofia o pérdida de vello. A veces aparecen zonas tensas y brillantes, otras se observan cercos de punciones.

Palpar irregularidades en la piel, pequeñas hipertrofias no visibles. A menudo son asimétricas porque la mano dominante se utiliza para pinchar el lado opuesto del cuerpo.

6. ¿CUALES SON LOS RIESGOS ASOCIADOS A LA LIPODISTROFIA?

Las lipodistrofias son antiestéticas, deforman el área respecto a zonas vecinas y esto produce su rechazo. Tienen un impacto psicológico negativo.

El mayor riesgo es que en las zonas afectadas por lipodistrofia se produce una absorción errática de la insulina. Los pacientes, dado que las zonas lipodistróficas son zonas menos dolorosas a la inyección, continúan a menudo inyectando en ellas la insulina, produciéndose alteraciones en el control glucémico. En un primer momento el hecho de continuar inyectando en estas zonas menos dolorosas aumenta el riesgo de hiperglucemia. Esto lleva a incrementar dosis de insulina administradas, con el riesgo de hipoglucemia cuando se rota y se inyecta en zonas de absorción normal.

7. ¿QUE HACER UNA VEZ DESARROLLADA LA LIPODISTROFIA?

Rotar los puntos de inyección con la esperanza de regresión de las lesiones, lo cual reducirá las necesidades de insulina y mejorará el control glucémico.

Otra opción, siempre prescrita por el facultativo correspondiente, es cambiar el tipo de insulina y o el sistema de administración.

En último lugar, cuando los medios anteriores no han funcionado, puede recurrirse a técnicas quirúrgicas como la liposucción.

8. ¿CÓMO PREVENIR LA LIPODISTROFIA?

Adecuada rotación de las zonas de punción, y de los lados del cuerpo.

Recambio apropiado de agujas y catéteres.

Autoevaluación de las zonas de punción

COLIPEX®

FORMULA INNOVADORA QUE OFRECE UNA SOLUCION PREVENTIVA AL PACIENTE DIABETICO MINIMIZANDO EL RIESGO DE DESARROLLO DE LIPODISTROFIAS

COLIPEX®

TRATAMIENTO EMOLIENTE Y CALMANTE EN CASO DE DIABETES MELLITUS

FÓRMULA INNOVADORA QUE OFRECE UNA **SOLUCIÓN** PREVENTIVA AL PACIENTE **DIABÉTICO** MINIMIZANDO EL RIESGO DE DESARROLLO DE LIPODISTROFIAS

- Innovación Cosmética
- Complejo Patentado
- Formulación única de elementos activos:

CREMA PARA EL CUERPO
PRESENTACIÓN MONODOSIS
30 SOBRES de 2ml
Uso externo

REF DIPOOLIPEX Premtkg 122013

Colágeno y elastina
actúan a nivel estructural en la dermis mejorando su elasticidad y resistencia.

L-carnitina y cafeina
actúan sobre la lipólisis y la lipogénesis, mejorando de la superficie de la piel.

Arnica montana
estimula activamente la regeneración de las células en el caso de inflamación local. Eficaz para la reabsorción de la hemorragia interna en el caso de hematomas en la piel.

Hamamelis virginiana
protege la piel frente a pequeñas inflamaciones y hematomas.

Aloe barbadensis
acelera proceso la curación de la piel.

Thymus vulgaris
efecto antiinflamatorio y antiséptico de heridas superficiales de la piel.

COLIPEX ® SE PRESENTA EN UN PRÁCTICO FORMATO DE 30 SOBRES MONODOSIS.

Ventajas:

- ÓPTIMA CONSERVACIÓN DE LOS INGREDIENTES RESPECTO A PRESENTACIONES TRADICIONALES
- PRACTICA Y FACIL DE TRANSPORTAR SIN RIESGOS DE VERTIDO
- FACILIDAD DE USO, UNA VEZ AL DIA ANTES DE DORMIR, MEDIANTE SUAVE MASAJE SOBRE LA ZONA AFECTADA.
- REDUCE EL COSTE DE TRATAMIENTO AL AJUSTAR LA DOSIS NECESARIA

Harmonium Pharma Ibérica

Harmonium Pharma